



【S-1+CPT-11療法について】 (S-1+イリノテカン)




様

1

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
S-1 OD錠	抗がん剤です	朝・夕 内服																													
アロキシバグ デキサー注	吐き気止めです	15分		1回														1回													
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・昼 内服																													
イリノテカン注	抗がん剤です	90分																													



😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
		11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
		食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																													
	下痢																														
		便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																													
	口内炎																														
	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																														
色素沈着																															
	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																														
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																															
	髪質が少し変わることもありますが、治療終了後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																														
検査値	白血球減少																														
		感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																													
	赤血球減少(貧血)																														
	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																														
血小板減少																															
	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																														



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。



【XELOX療法について】

(カペシタビン+エルプラット)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3
アロキシ注 デキサート注	吐き気止めです	15分	💉																					💉
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・昼 内服		🍩	🍩	🍩	🍩																	
エルプラット注	抗がん剤です	2時間	💉																					💉
カペシタビン錠	抗がん剤です	朝・夕 内服	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩	🍩							🍩

😊 治療による副作用

注意が必要な時期

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3	
自覚症状																							
過敏症	#REF!																						
食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																						
手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。																						
口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																						
下痢	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																						
手足症候群	手足がチクチクと痛い、赤く腫れる、ひび割れ、水疱が生じることがあるので、保湿剤を使い手足の乾燥を予防しましょう。																						
色素沈着	肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。																						
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療終了後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																						
検査値																							
白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																						
赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																						
血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																						
肝機能低下	体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。																						



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。



【R-CHOP療法について】
 (リツキシマブ+エンドキサン+ドキシソルピシン+オンコビン+プレドニゾン)



😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			10/26 月	10/27 火	10/28 水	10/29 木	10/30 金	10/31 土	11/1 日	11/2 月	11/3 火	11/4 水	11/5 木	11/6 金	11/7 土	11/8 日	11/9 月	11/10 火	11/11 水	11/12 木	11/13 金	11/14 土	11/15 日	11/16 月
カロナール錠	アレルギー様症状を抑える薬です	1日1回 内服																1回2錠						
レスタミン錠		1日1回 内服																1回3錠						
リツキシマブ注	抗がん剤です	3~4時間																						
グラニセトロンバッグ	吐き気止めです	15分	📺																					📺
オンコビン注	抗がん剤です	15分	📺																					📺
ドキシソルピシン注	抗がん剤です	15分	📺																					📺
エンドキサン注	抗がん剤です	30分	📺																					📺
プレドニゾン錠	ステロイドです	朝・昼 内服	📺	📺	📺	📺	📺																	📺

この週はお休みです。

尿が赤くなることがあります。

朝錠、昼錠

注意が必要な時期

😊 **治療による副作用**

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		10/26 月	10/27 火	10/28 水	10/29 木	10/30 金	10/31 土	11/1 日	11/2 月	11/3 火	11/4 水	11/5 木	11/6 金	11/7 土	11/8 日	11/9 月	11/10 火	11/11 水	11/12 木	11/13 金	11/14 土	11/15 日	11/16 月
自覚症状	アレルギー様症状	発熱や寒気、吐き気、頭痛、めまい、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。																					
	食欲不振・吐き気	食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。																					
	不眠	寝つきが悪くなる時があります。症状があるときはお知らせください。																					
	胃部不快感	胃の痛みやゲップ、むかつき、腹部膨満感、食欲がないなど、気になる症状があるときはお知らせください。																					
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出る場合があります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。																					
	便秘	水分を多めに摂りましょう。続く場合はお薬で調節した方が良いでしょう、お知らせ下さい。																					
	発熱	悪寒、発熱があるときはお知らせください。																					
	手足のしびれ	手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																					
検査値	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)	髪質が少し変わることもありますが、治療終了後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																					
	白血球減少	感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。																					
	赤血球減少(貧血)	貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。																					
	血小板減少	出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。																					

心機能低下 (治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

出血性膀胱炎(排尿時の不快感、尿に血が混ざるなどの症状があるときはお知らせください。)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。