

レジメンとは、薬物療法を行う上で、薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のことをいいます。		参考文献：がん情報サービス 用語集
がん化学療法レジメン集の見方		
レジメン名	当院で登録されているレジメンの名称を記載しています。	
がん種	レジメンが適応となるがん種を記載しています。	
使用診療科	レジメンを使用する診療科を記載しています。	
薬品名	レジメンで使用する各薬剤の一般名 (又は商品名) を記載しています。複数種類の抗がん剤を組み合わせるレジメンもあります。	
1日投与量	レジメンで使用する各薬剤の投与量 (1日) を記載しています。患者毎の体表面積、体重等により投与量が決まる薬剤もあります。	
投与時間	点滴投与の薬剤→分、時間 等で投与時間を記載しています。静注ではない場合は投与経路 (皮下注等) を記載しています。	
投与日 (Day)	1コース中での投与日を記載しています。	
投与間隔	1コースの投与期間を記載しています。	
制吐療法	レジメンに使用している制吐剤を記載しています。制吐療法診療ガイドラインに基づき、各レジメンの嘔吐リスクに応じた制吐剤を使用しています。 高度リスク (high emetic risk : HEC) : 90%を超える患者に発現する 中等度リスク (moderate emetic risk : MEC) : 30~90%の患者に発現する 軽度リスク (low emetic risk : LEC) : 10~30%の患者に発現する 使用する制吐剤はデキサメタゾン (DEX)、5-HT3受容体拮抗薬 (5-HT3R Blocker、グラネセトロン・パロノセトロン)、NK1受容体拮抗薬 (NK1R Blocker、アプレピタント・ホスアプレピタント・ホスネツピタント)、オランザピン (Ola) となります。	
備考	レジメン毎の注意点等、特記事項がある場合に記載しています。	

制吐療法 (記号)	レジメン上の制吐療法の内訳
H1	NK1R Blocker+5-HT3R Blocker+ DEX+オランザピン
H2	NK1R Blocker+5-HT3R Blocker+ DEX
H3	5-HT3R Blocker+ DEX
H4	5-HT3R Blocker
M1	NK1R Blocker+5-HT3R Blocker+ DEX
M2	5-HT3R Blocker+ DEX
M3	5-HT3R Blocker
M4	DEX
M5	なし
L1	5-HT3R Blocker+ DEX
L2	5-HT3R Blocker
L3	DEX
L4	なし

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
BV + CAPOX	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン エルブラット カベシタピン	7.5mg/kg 130mg/m ² 200mg/m ²	30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	M2	
BV + FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	30分 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M1 or M2	
BV + FOLFOXIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン イリノテカン エルブラット レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 165mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 3200mg/m ²	30分 90分 2時間 2時間 46時間	1 1 1 1 1~2	14日毎	H2	
BV + IRIS	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン イリノテカン S-1	5mg/kg 100mg/m ² 80~120mg/body	30分 90分 経口	1、15 1、15 1~14	28日毎	M2	
BV + mFOLFOX6	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン エルブラット レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	30分 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M2	
BV + S-DeGramont	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	30分 2時間 5分/46時間	1 1 1~2	14日毎	L1	
BV + SOX	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン エルブラット S-1	7.5mg/kg 130mg/m ² 80~120mg/body	30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	M2	
BV + XELIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン イリノテカン カベシタピン	7.5mg/kg 200mg/m ² 1600mg/m ²	30分 90分 経口	1 1 1~14	21日毎	M1 or M2	
CAPOX (XELOX)	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	エルブラット カベシタピン	130mg/m ² 2000mg/m ²	2時間 経口	1 1~14	21日毎	M2	
Cmab/FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アービタックス イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²) 180mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	2~1時間 (2時間) 2時間 2時間 5分/46時間	1、8 (1) 1 1 1~2	14日毎	M1	

がん化学療法レジメン集 (2023年5月版)

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
Cmab/mFOLFOX	大腸がん	消化器内科消化管	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1、8 (1)	14日毎	M1	
		消化器外科大腸	エルブラット	85mg/m ²	2時間	1			
		腫瘍内科	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	1			
			フルオロウラシル	400・2400mg/m ²	5分/46時間	1~2			
Cmab/隔週CPT-11	大腸がん	消化器内科消化管	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1、8 (1)	14日毎	M1	
		消化器外科大腸	イリノテカン	150mg/m ²	90分	1			
Cmab+IRIS	大腸がん	消化器外科大腸	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1、8、15、22 (1、15)	28日毎	M1	
			イリノテカン	100mg/m ²	90分	1、15			
			S-1	80~120mg/body	経口	1~14			
Cmab単独 (+ピラフトビ)	大腸がん	消化器内科消化管	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1 (1)	7日毎 (14日毎)	-	
		消化器外科大腸	ピラフトビ	300mg/body	経口	連日			
Cmab単独 (+ピラフトビ+メクトビ)	大腸がん	消化器内科消化管	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1 (1)	7日毎 (14日毎)	-	
		消化器外科大腸	ピラフトビ	300mg/body	経口	連日			
		腫瘍内科	メクトビ	45mg/body	経口	連日			
Cmab単独	大腸がん	消化器内科消化管	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1 (1)	7日毎 (14日毎)	-	
		消化器外科大腸	アービタックス	初回400mg/m ² →以降250mg/m ² (隔週500mg/m ²)	2~1時間 (2時間)	1 (1)			
CPT-11 (IRIS用)	大腸がん	消化器内科消化管	イリノテカン	120mg/m ²	90分	1、15	28日毎	M3	
		消化器外科大腸	S1	80~120mg/body	経口	1~14			
FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管	イリノテカン	180mg/m ²	2時間	1	14日毎	M2	
		消化器外科大腸	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	1			
		腫瘍内科	フルオロウラシル	400・2400mg/m ²	5分/46時間	1~2			
mFOLFOX6	大腸がん	消化器内科消化管	エルブラット	85mg/m ²	2時間	1	14日毎	M2	
		消化器外科大腸	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	1			
		腫瘍内科	フルオロウラシル	400・2400mg/m ²	5分/46時間	1~2			
mFOLFOXIRI + BV	大腸がん	消化器内科消化管	アバスチン	5mg/kg	30分	1	14日毎	H2	
		消化器外科大腸	イリノテカン	150mg/m ²	90分	1			
		腫瘍内科	エルブラット	85mg/m ²	2時間	1			
			レボホリナート	200mg/m ²	2時間	1			
			フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	1~2			
Nivo (240mg) (MSI-High)	大腸がん	消化器内科消化管	オブジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	-	
Nivo (480mg) (MSI-High)	大腸がん	消化器内科消化管	オブジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	-	
Nivo (240mg) +ipi(1-4回目) (MSI-High)	大腸がん	消化器内科消化管	オブジーボ	240mg/body	30分	1	21日毎	-	
	消化器外科大腸	ヤーボイ	1mg/kg	30分	1				
PalRIS	大腸がん	消化器外科大腸	ベクティビックス	6mg/kg	60分	1、15	28日毎	M2	
			イリノテカン	120mg/m ²	90分	1、15			
			S-1	80~120mg/body	経口	1~14			
Pmab/CPT-11	大腸がん	消化器内科消化管	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	1	14日毎	M1	
		消化器外科大腸	イリノテカン	180mg/m ²	90分	1			
Pmab+FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	1	14日毎	M1 or M2	
		消化器外科大腸	イリノテカン	180mg/m ²	2時間	1			
		腫瘍内科	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	1			
			フルオロウラシル	400・2400mg/m ²	5分/46時間	1~2			

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
Pmab+mFOLFOX6	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	ベクティビックス エルブラット レボホリナート フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M2	
Pmab単独	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	ベクティビックス	6mg/kg	1時間	1	14日毎	—	
S-DeGramont	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	レボホリナート フルオロウラシル	200mg/m ² 400・2400mg/m ²	5分/46時間	1	14日毎	L1	
TAS-102+BV	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	アバスチン ロンサーフ	5mg/kg 70mg/m ²	30分 経口	1、15 1~5、8~12	28日毎	—	必要時経口制吐薬追加
TS1+CPT-11	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	イリノテカン S-1	80mg/m ² 80~120mg/body	90分 経口	1、15 1~14	28日毎	M1 or M2	
サイラムザ/FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	サイラムザ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	8mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	60分→以降30分 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M1	
ザルトラップ/FOLFIRI	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	ザルトラップ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	4mg/kg 180mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	1時間 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M1	
ベルツズマブ+トラスツズマブ	大腸がん	消化器内科消化管 消化器外科大腸 腫瘍内科	トラスツズマブ ベルツズマブ	初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	初回90分→以降30分 初回60分→以降30分	1 1	21日毎	—	
mFOLFOX6	小腸がん共通	消化器内科消化管 消化器外科大腸	エルブラット レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1~2	14日毎	M2	
先進医療 JCOG1502C CAPOX	小腸がん共通	消化器内科消化管 消化器外科大腸	エルブラット カベシタビン	130mg/m ² 200mg/m ²	2時間 経口	1 1~14	21日毎	M2	
Amr（40mg/m ² ）	肺がん	呼吸器内科	カルセド	40mg/m ²	10分	1、2、3	21日毎	M2	
Atezo	肺がん	呼吸器内科	テセントリク	1200mg/body	60分→以降30分	1	21日毎	—	
Atezo+Bev	肺がん	呼吸器内科	テセントリク アバスチン	1200mg/body 15mg/kg	60分→以降30分 30分	1 1	21日毎	—	
Atezo+Car+Eto	肺がん	呼吸器内科	テセントリク エトゴシド カルボプラチン	1200mg/body 100mg/m ² AUC=5	60分→以降30分 60分 60分	1 1、2、3 1	21日毎	M2	
Atezo+Car+nabPac	肺がん	呼吸器内科	テセントリク アブラキサン カルボプラチン	1200mg/body 100mg/m ² AUC=6	60分→以降30分 30分 60分	1 1、8、15 1	21日毎	M2	
Atezo+Car+Pac+Bev	肺がん	呼吸器内科	テセントリク パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	1200mg 200mg/m ² AUC=6 15mg/kg	60分→以降30分 180分 60分 30分	1 1 1 1	21日毎	M2	
Atezo+Car+Pem	肺がん	呼吸器内科	テセントリク ペメトレキセド カルボプラチン	1200mg/body 500mg/m ² AUC=6	60分→以降30分 10分 60分	1 1 1	21日毎	M2	バンビタン末連日経口
Atezo+Cis+Pem（Short Hydration）	肺がん	呼吸器内科	テセントリク ペメトレキセド シスプラチン	1200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	60分→以降30分 10分 60分	1 1 1	21日毎	H2	バンビタン末連日経口
Atezo+Pem	肺がん	呼吸器内科	テセントリク ペメトレキセド	1200mg/body 500mg/m ²	60分→以降30分 10分	1 1	21日毎	L1	バンビタン末連日経口
Atezo術後（呼吸器）	肺がん	呼吸器内科	テセントリク	1200mg/body	60分→以降30分	1	21日毎	—	
Bev	肺がん	呼吸器内科	アバスチン	15mg/kg	30分	1	21日毎	—	
Car（低用量連日）放射線同時併用療法	肺がん	呼吸器内科	カルボプラチン	30mg/m ²	30分	1、2、3、4、5	計20日間	M3	RT併用

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
Car+Doc	肺がん	呼吸器内科	ドセタキセル カルボプラチン	60mg/㎡ AUC = 4	60分 60分	1 1	21日毎	M2	
Car+Eto	肺がん	呼吸器内科	エトボシド カルボプラチン	100mg/㎡ AUC = 5	60分 60分	1、2、3 1	21日毎	M2	
Car+Gem	肺がん	呼吸器内科	ジェムザール カルボプラチン	1000mg/㎡ AUC = 5	30分 60分	1、8 1	21日毎	M2	
Car+nabPac	肺がん	呼吸器内科	アブラキサン カルボプラチン	100mg/㎡ AUC = 6	30分 60分	1、8、15 1	21日毎	M2	
Car+Pac	肺がん	呼吸器内科	パクリタキセル カルボプラチン	200mg/㎡ AUC = 6	180分 60分	1 1	21日毎	M2	
Car+Pac 放射線同時併用	肺がん	呼吸器内科	パクリタキセル カルボプラチン	40mg/㎡ AUC = 2	60分 60分	1、8、15、22、29、36 1	42日毎	M2	
Car+Pac+Bev	肺がん	呼吸器内科	パクリタキセル カルボプラチン アバスチン	200mg/㎡ AUC = 6 15mg/kg	180分 60分 30分	1 1 1	21日毎	M2	
Car+Pem	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド カルボプラチン	500mg/㎡ AUC = 6	10分 60分	1 1	21日毎	M2	バンビタン末連日経口
Car+Pem+Bev	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド カルボプラチン アバスチン	500mg/㎡ AUC = 6 15mg/kg	10分 60分 30分	1 1 1	21日毎	M2	バンビタン末連日経口
Car+S1	肺がん	呼吸器内科	カルボプラチン S-1	AUC=5 80~120mg/body	60分 経口	1 1~14	21日毎	M2	
Cis+Doc 同時照射 (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	シスプラチン ドセタキセル	40mg/㎡ 40mg/㎡	60分 60分	1、8 1、8	28日毎	H2	RT併用
Cis+Doc (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	シスプラチン ドセタキセル	80mg/㎡ 60mg/㎡	60分 60分	1 1	21日毎	H2	
Cis+Doc+Bev (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	シスプラチン ドセタキセル アバスチン	80mg/㎡ 60mg/㎡ 15mg/kg	60分 60分 30分	1 1 1	21日毎	H2	
Cis+Eto (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	エトボシド シスプラチン	100mg/㎡ 80mg/㎡	60分 60分	1、2、3 1	21日毎	H2	
Cis+Gem (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	ジェムザール シスプラチン	1000mg/㎡ 80mg/㎡	30分 60分	1、8 1	21日毎	H2	
Cis+Iri (小細胞 Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	イリノテカン シスプラチン	60mg/㎡ 60mg/㎡	90分 60分	1、8、15 1	28日毎	H2	
Cis+Iri (非小細胞 Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	イリノテカン シスプラチン	60mg/㎡ 80mg/㎡	90分 60分	1、8、15 1	28日毎	H2	
Cis+Pem (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド シスプラチン	500mg/㎡ 75mg/㎡	10分 60分	1 1	21日毎	H2	バンビタン末連日経口
Cis+Pem+Bev (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド シスプラチン アバスチン	500mg/㎡ 75mg/㎡ 15mg/kg	10分 60分 30分	1 1 1	21日毎	H2	バンビタン末連日経口
Cis+S1 (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	シスプラチン S-1	60mg/㎡ 80~120mg/body	60分 経口	1 1~14	21日毎	H2	
Cis+Vin (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	ビノレルビン シスプラチン	25mg/㎡ 80mg/㎡	10分 60分	1、8 1	21日毎	H2	
Doc	肺がん	呼吸器内科	ドセタキセル	60mg/㎡	60分	1	21日毎	L3	
Doc+Bev	肺がん	呼吸器内科	ドセタキセル アバスチン	60mg/㎡ 15mg/kg	60分 30分	1 1	21日毎	L3	
Doc+Ram	肺がん	呼吸器内科	サイラムザ ドセタキセル	10mg/kg 60mg/㎡	60分→以降30分 60分	1 1	21日毎	L3	
Durva	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ	10mg/kg	60分	1	14日毎	—	
Durva (1500mg) (維持)	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ	1500mg/body	60分	1	28日毎	—	
Durva+Car+Eto	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ エトボシド カルボプラチン	1500mg/body 100mg/㎡ AUC = 6	60分 60分 60分	1 1、2、3 1	21日毎	M2	
Durva+Cis+Eto (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ エトボシド シスプラチン	1500mg/body 100mg/㎡ 80mg/㎡	60分 60分 60分	1 1、2、3 1	21日毎	H2	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
Durva + Treme + Car + nabPTX	肺がん	呼吸器内科	イジユド イミフィンジ アブラキサン カルボプラチン	75mg/body 1500mg/body 100mg/m ² AUC = 6	1時間 1時間 30分 1時間	1 1 1、8、15 1	21日毎	M2	
維持Durva + Treme 5 + 6コース目	肺がん	呼吸器内科	イジユド イミフィンジ	75mg/body 1500mg/body	1時間 1時間	29 1、29	56日毎 (1コース 28日毎)	—	
維持Durva 7コース目以降	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	1	28日毎	—	
Durva + Treme + Car + Pem	肺がん	呼吸器内科	イジユド イミフィンジ ペメトレキセド カルボプラチン	75mg/body 1500mg/body 500mg/m ² AUC = 6	1時間 1時間 10分 1時間	1 1 1 1	21日毎	M2	バンビタン末連日経口
維持Durva + Treme + Pem 5 + 6コース目	肺がん	呼吸器内科	イジユド イミフィンジ ペメトレキセド	75mg/body 1500mg/body 500mg/m ²	1時間 1時間 10分	29 1、29 1、29	56日毎 (1コース 28日毎)	L1	バンビタン末連日経口
維持Durva + Pem 7コース目以降	肺がん	呼吸器内科	イミフィンジ ペメトレキセド	1500mg/body 500mg/m ²	1時間 10分	1 1	28日毎	L1	バンビタン末連日経口
Gem統一	肺がん	呼吸器内科	ジェムザール	1000mg/m ²	30分	1、8、15	28日毎	L3	
Iri	肺がん	呼吸器内科	イリノテカン	100mg/m ²	90分	1、8、15	28日毎	M2	
nabPac	肺がん	呼吸器内科	アブラキサン	100mg/m ²	30分	1、8、15	21日毎	L3	
Neci+Cis+Gem (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	ボートラーザ ジェムザール シスプラチン	800mg 1250mg/m ² 75mg/m ²	60分 30分 60分	1、8 1、8 1	21日毎	H2	
Neda+Iri	肺がん	呼吸器内科	イリノテカン アクブラ	50mg/m ² 50mg/m ²	90分 60分	1、8 1、8	28日毎	M2	
Niv (240mg) (呼吸器)	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
Niv (480mg) (呼吸器)	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
Niv+Car+Pac	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ バクリタキセル カルボプラチン	360mg/body 200mg/m ² AUC = 6	30分 180分 60分	1 1 1	21日毎	M2	
Niv+Ipi (呼吸器)	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	1、22 1	42日毎	—	
Niv+Ipi+Car+Pac	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ ヤーボイ バクリタキセル カルボプラチン	360mg/body 1mg/kg 200mg/m ² AUC = 6	30分 30分 180分 60分	1、22 1 1、22 1、22	42日毎	M2	1コースのみ
Niv+Ipi+Car+Pem	肺がん	呼吸器内科	オブジーボ ヤーボイ ペメトレキセド カルボプラチン	360mg/body 1mg/kg 500mg/m ² AUC = 6	30分 30分 10分 60分	1、22 1 1、22 1、22	42日毎	M2	1コースのみ
Nogi	肺がん	呼吸器内科	ハイカムチン	1mg/m ²	30分	1、2、3、4、5	21日毎	L3	
Pem	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド	500mg/m ²	10分	1	21日毎	L1	バンビタン末連日経口
Pem+Bev	肺がん	呼吸器内科	ペメトレキセド アバスチン	500mg/m ² 15mg/kg	10分 30分	1 1	21日毎	L1	バンビタン末連日経口
Pembro (200mg) (呼吸器)	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
Pembro (400mg) (呼吸器)	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
Pembro+Car+nabPac	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ アブラキサン カルボプラチン	200mg/body 100mg/m ² AUC = 6	30分 30分 60分	1 1、8、15 1	21日毎	M2	
Pembro+Car+Pac	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ バクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 200mg/m ² AUC = 6	30分 180分 60分	1 1 1	21日毎	M2	
Pembro+Car+Pem	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ ペメトレキセド カルボプラチン	200mg/body 500mg/m ² AUC = 5	30分 10分 60分	1 1 1	21日毎	M2	バンビタン末連日経口
Pembro+Cis+Pem (Short Hydration)	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ ペメトレキセド シスプラチン	200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	30分 10分 60分	1 1 1	21日毎	H2	バンビタン末連日経口

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
Pembro+Pem	肺がん	呼吸器内科	キイトルーダ ペメトレキセド	200mg/body 500mg/m ²	30分 10分	1 1	21日毎	L1	バンビタン末連日経口
Ram（エルロチニブ併用）	肺がん	呼吸器内科	サイラムザ エルロチニブ	10mg/kg 150mg	60分→以降30分 経口	1 連日	14日毎	—	
Vin	肺がん	呼吸器内科	ビノレルビン	25mg/m ²	10分	1、8	21日毎	—	血管炎予防でDEX注使用
Niv（240mg）（悪性胸膜中皮腫）	悪性胸膜中皮腫	呼吸器内科	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
Niv（480mg）（悪性胸膜中皮腫）	悪性胸膜中皮腫	呼吸器内科	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
Niv+Ipi（悪性胸膜中皮腫）	悪性胸膜中皮腫	呼吸器内科	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	1、22 1	42日毎	—	
VP-16+CDDP+BLM（BEP）	悪性胚細胞腫	呼吸器内科	エトボシド シスプラチン ブレオ	100mg/m ² 20mg/m ² 30mg	60分 60分 30分	1、2、3、4、5 1、2、3、4、5 1、8、15	21日毎	H3	
ADOC（Short Hydration）	胸腺腫	呼吸器内科	ドキシソルピシン シスプラチン オンコピン エンドキサソ	40mg/m ² 50mg/m ² 0.6mg/m ² 700mg/m ²	10分 60分 全開 30分	1 1 3 4	21日毎	H2	
5FU/LV（6投2休）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	フルオロウラシル レボホリナート	600mg/m ² 250mg/m ²	5分 2時間	1、8、15、 22、29、36	56日毎	L1	
5FU持続	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間毎	1~5	28日毎	L4	
biweekly CPT-11	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	イリノテカン	150mg/m ²	90分	1	14日毎	M1	
biweekly バクリタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	バクリタキセル	140mg/m ²	3時間	1、15	28日毎	L3	
CAPOX	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エルプラット カベシタピン	130mg/m ² 2000mg/m ²	2時間 経口	1 1~14	21日毎	M1	
CAPOX+Nivo	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オプジーボ エルプラット カベシタピン	360mg/body 130mg/m ² 2000mg/m ²	30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	M1	
CPT-11 + CDDP（2週毎）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	イリノテカン シスプラチン	60mg/m ² 30mg/m ²	90分 90分	1	14日毎	H2	
DCS	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル シスプラチン S-1	40mg/m ² 60mg/m ² 80~120mg/body	60分 2時間 経口	1 1 1~14	28日毎	H2	
FLTAX	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	バクリタキセル レボホリナート フルオロウラシル	80mg/m ² 250mg/m ² 600mg/m ²	1時間 2時間 5分	1、8、15 1、8、15 1、8、15	28日毎	L3	
FOLFOX+Nivo	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オプジーボ エルプラット レボホリナート フルオロウラシル	240mg/body 85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	30分 2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	M1	
MF（MTX+5FU）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	メソトレキセート フルオロウラシル ロイコポリン	100mg/m ² 600mg/m ² 10mg/m ² ×6	5分 5分 経口	1 1	7日毎	L4	MTX投与後24時間後より6時間毎に服用
mFOLFOX6	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エルプラット レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1~2	14日毎	M1	
SOX（130mg/m ² ）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エルプラット S-1	130mg/m ² 80~120mg/body	2時間 経口	1 1~14	21日毎	M1	
SOX+Nivo	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オプジーボ エルプラット S-1	360mg/body 130mg/m ² 80~120mg/body	30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	M1	
SOX+Trastuzumab	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	トラスツズマブ エルプラット S-1	初回8mg/kg→以降6mg/kg 130mg/m ² 80~120mg/body	90分→以降30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	M1	
SP 3W	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン S-1	60mg/m ² 80~120mg/body	2時間 経口	1 1~14	21日毎	H2	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
SP 4W	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン S-1	60mg/㎡ 80~120mg/body	2時間 経口	8 1~21	28日毎	H2	
SP 5W	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン S-1	60mg/㎡ 80~120mg/body	2時間 経口	8 1~21	35日毎	H2	
SP+Trastuzumab	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	トラスツズマブ シスプラチン S-1	初回8mg/kg→以降6mg/kg 60mg/㎡ 80~120mg/body	90分→以降30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	H2	
T-DXd	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エンハーツ	6.4mg/kg	90→以降30分	1	21日毎	M1	
trastuzumab+wPTX	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	トラスツズマブ パクリタキセル	初回8mg/kg→以降6mg/kg 80mg/㎡	90分→以降30分 1時間	1 1、8、15	21日毎 28日毎	L3	
triweekly アブラキサン	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	アブラキサン	260mg/㎡	30分	1	21日毎	L3	
triweekly ドセタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル	60mg/㎡	90分	1	21日毎	L3	
triweekly パクリタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	パクリタキセル	210mg/㎡	3時間	1	21日毎	L3	
TS-1+CPT-11	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	イリノテカン S-1	80mg/㎡ 80~120mg/body	90分 経口	1、15 1~21	35日毎	M2	
TS-1+ドセタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル S-1	40mg/㎡ 80~120mg/body	90分 経口	1 1~14	21日毎	L3	
TS-1+パクリタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	パクリタキセル S-1	50mg/㎡ 80~120mg/body	60分 経口	1、8 1~14	21日毎	L3	
weekly paclitaxel	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	パクリタキセル	80mg/㎡	1時間	1、8、15	28日毎	L3	
weekly アブラキサン	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	アブラキサン	100mg/㎡	30分	1、8、15	28日毎	L3	
XP	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン カベシタピン	80mg/㎡ 2000mg/㎡	2時間 経口	1 1~14	21日毎	H2	
XP+Trastuzumab	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	トラスツズマブ シスプラチン カベシタピン	初回8mg/kg→以降6mg/kg 80mg/㎡ 2000mg/㎡	90分→以降30分 2時間 経口	1 1 1~14	21日毎	H2	
サイラムザ+アブラキサン	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	サイラムザ アブラキサン	8mg/kg 100mg/㎡	60分→以降30分 30分	1、15 1、8、15	28日毎	L3	
サイラムザ+パクリタキセル	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	サイラムザ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/㎡	60分→以降30分 1時間	1、15 1、8、15	28日毎	L3	
サイラムザ単剤	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	サイラムザ	8mg/kg	60分→以降30分	1	14日毎	—	
ニボルマブ（胃240mg）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オブジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
ニボルマブ（胃480mg）	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オブジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
パクリタキセル+CDDP	胃がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	パクリタキセル シスプラチン	80mg/㎡ 25mg/㎡	1時間 90分	1、15 1、15	28日毎	H3	
（維持）デュルバルマブ療法	胆道がん	消化器内科肝胆膵	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	1	28日毎	—	
GC+デュルバルマブ療法	胆道がん	消化器内科肝胆膵	イミフィンジ シスプラチン ジェムザール	1500mg/body 25mg/㎡ 1000mg/㎡	1時間 1時間 30分	1 1、8 1、8	21日毎	M2	
ゲムシタピン・シスプラチン併用療法	胆道がん	消化器内科肝胆膵	シスプラチン ジェムザール	25mg/㎡ 1000mg/㎡	60分 30分	1、8 1、8	21日毎	M2	
胆道癌GCS（臨時1週分）	胆道がん	消化器内科肝胆膵	シスプラチン ジェムザール S-1	25mg/㎡ 1000mg/㎡ 80~120mg/body	60分 30分 経口	1 1 1~7	14日毎	M2	
ATZ/BEV	肝細胞がん	消化器内科肝胆膵	テセントリク アバスチン	1200mg/body 15mg/kg	60分→以降30分 30分	1 1	21日毎	—	
デュルバルマブ	肝細胞がん	消化器内科肝胆膵	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	1	28日毎	—	
デュルバルマブ+トレメリムマブ療法（1コース目）	肝細胞がん	消化器内科肝胆膵	イジユド イミフィンジ	300mg/body 1500mg/body	1時間 1時間	1	28日毎	—	

がん化学療法レジメン集 (2023年5月版)

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
デュルバルマブ+トレミマブ療法 (2コース目以降)	肝細胞がん	消化器内科肝胆膵	イミフィンジ	1500mg/body	1時間	1	28日毎	—	
ラムシルマブ	肝細胞がん	消化器内科肝胆膵	サイラムザ	8mg/kg	60分→以降30分	1	14日毎	—	
FOLFIRINOX	膵がん	消化器内科肝胆膵	エルプラット イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/㎡ 180mg/㎡ 200mg/㎡ 400・2400mg/㎡	120分 90分 2時間 5分/46時間	1 1 1 1~2	14日毎	H2	
GEM+nab-PTX	膵がん	消化器内科肝胆膵	アブラキサン ジェムザール	125mg/㎡ 1000mg/㎡	30分 30分	1、8、15 1、8、15	28日毎	M2	
GEM+S-1療法	膵がん	消化器内科肝胆膵	ジェムザール S-1	1000mg/㎡ 80~120mg/body	30分 経口	1、8 1~14	21日毎	L3	術前は2クール
統一GEM	膵がん・胆道がん	消化器内科肝胆膵	ジェムザール	1000mg/㎡	30分	1、8、15	28日毎	L3	
GEM+エルロチニブ療法	膵がん	消化器内科肝胆膵	ジェムザール エルロチニブ	1000mg/㎡ 100mg/body	30分 経口	1、8、15 連日	28日毎	L3	
modifaid FFX	膵がん	消化器内科肝胆膵	エルプラット イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル	85mg/㎡ 150mg/㎡ 200mg/㎡ 2400mg/㎡	120分 90分 2時間 46時間	1 1 1 1~2	14日毎	H2	
NAPOLI	膵がん	消化器内科肝胆膵	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	70mg/㎡ 200mg/㎡ 2400mg/㎡	90分 2時間 46時間	1 1 1~2	14日毎	M2	
weekly STZ(1000mg/㎡)	神経内分泌腫瘍	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1000mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
weekly STZ(1250mg/㎡)	神経内分泌腫瘍	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1250mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
weekly STZ(1500mg/㎡)	神経内分泌腫瘍	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1500mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
連続5日間投与 STZ療法 (500mg/㎡)	神経内分泌腫瘍	消化器内科肝胆膵	ザノサー	500mg/㎡	30分	1、2、3、4、5	42日毎	H3	
S-FU+STZ	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	フルオロウラシル ザノサー	400mg/㎡ 500mg/㎡	30分 30分	1~5 1~5	42日毎	H3	
DXR+STZ	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	ドキシソルピシン ザノサー	50mg/㎡ 500mg/㎡	30分 30分	1、22 1~5	42日毎	H3	
STZ (1000mg/㎡)	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1000mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
STZ (1250mg/㎡)	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1250mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
STZ (1500mg/㎡)	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	ザノサー	1500mg/㎡	30分	1	7日毎	H3	
連続5日間投与 STZ療法 (500mg/㎡)	膵消化管神経内分泌腫瘍(NET)	消化器内科肝胆膵	ザノサー	500mg/㎡	30分	1~5	42日毎	H3	
CPT-11 + CDDP (Short Hydration)	神経内分泌がん (NEC)	腫瘍内科 消化器内科消化管 消化器内科肝胆膵	イリノテカン シスプラチン	60mg/㎡ 60mg/㎡	1時間 1時間	1、8、15 1	28日毎	H2	
VP-16+CBDCA	神経内分泌がん (NEC)	腫瘍内科 消化器内科消化管 消化器内科肝胆膵	エトボシド カルボプラチン	100mg/㎡ AUC=5	1時間 1時間	1~3 1	21日毎	M2	
VP-16+CDDP	神経内分泌がん (NEC)	腫瘍内科 消化器内科消化管 消化器内科肝胆膵	エトボシド シスプラチン	100mg/㎡ 80mg/㎡	1時間 1時間	1~3 1	21日毎	H2	
アムルピシン	神経内分泌がん (NEC)	腫瘍内科	カルセド	40mg/㎡	10分	1~3	21日毎	M2	
biweeklyDOC + NED	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル アクブラ	30mg/㎡ 40mg/㎡	1時間 90分	1	14日毎	M1	
DCF	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/㎡ 80mg/㎡ 800mg/㎡	2時間 2時間 24時間	1 1 1~5	28日毎	H2	
FN	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	フルオロウラシル アクブラ	800mg/㎡ 90mg/㎡	24時間 90分	1~5 1	28日毎	M1	
FOLFOX + RT	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エルプラット レボホリナート フルオロウラシル	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400・1600mg/㎡	2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1~2	14日毎	M1	RT併用
FP	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/㎡ 800mg/㎡	2時間 24時間毎	1 1~5	21日毎	H2	
FP (1000/75) -RT Stage II/III	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン フルオロウラシル	75mg/㎡ 1000mg/㎡	2時間 24時間毎	1 1~4	28日毎	H2	RT併用
FP (CRT)	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	シスプラチン フルオロウラシル	70mg/㎡ 700mg/㎡	2時間 24時間毎	1 1~4	28日毎	H2	RT併用

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
FP+Pembro	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	キイトルーダ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/m ² 800mg/m ²	30分 2時間 24時間毎	1 1 1~5	21日毎	H2	
mFOLFOX6	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	エルブラット レボホリナート フルオロウラシル	85mg/m ² 200mg/m ² 400・2400mg/m ²	2時間 2時間 5分/46時間	1 1 1~2	14日毎	M1	
NAC DCF	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 70mg/m ² 750mg/m ²	1時間 2時間 24時間毎	1 1 1~5	21日毎	H2	
Nivo+Ipi療法	食道がん	消化器内科消化管	オプジーボ ヤーボイ	360mg/body 1mg/kg	30分 30分	1、22 1	42日毎	—	
triweekly ドセタキセル	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	ドセタキセル	70mg/m ²	90分	1	21日毎	L3	
術後Nivolumab療法（食道240mg）	食道がん	消化器外科胃食道	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
術後Nivolumab療法（食道480mg）	食道がん	消化器外科胃食道	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
食道weeklyパクリタキセル療法	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	1、8、15 or 1、8、15、22、29、36	28日毎 56日毎	L3	
ニボルマブ（食道240mg）	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
ニボルマブ（食道480mg）	食道がん	消化器内科消化管 消化器外科胃食道	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
【2日間】BR120療法(DLBCL)	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ トレアキシチン	375mg/m ² 120mg/m ²	初回50~400mg/時→以降90分 10分	1 1、2	21日毎	M1	
【3日間】BR120療法(DLBCL)	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ トレアキシチン	375mg/m ² 120mg/m ²	初回50~400mg/時→以降90分 10分	1 2、3	21日毎	M1	
G-CHOP療法	悪性リンパ腫	腫瘍内科	ガザイバ オンコピン ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾロン	1000mg 1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	50~400mg/時 15分 15分 30分 経口	1、8、15 1 1 1 1~5	21日毎	H4	2コース以降はガザイバはDay1のみ
G-CVP療法	悪性リンパ腫	腫瘍内科	ガザイバ オンコピン エンドキサン プレドニゾロン	1000mg 1.4mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	50~400mg/時 15分 30分 経口	1、8、15 1 1 1~5	21日毎	M3	2コース以降はガザイバはDay1のみ
GEM+DEX+CDDP（GDP）	悪性リンパ腫	腫瘍内科	ジェムザール シスプラチン デカドロン	1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg	30分 2時間 経口	1、8 1 1~4	21日毎	H2	
P-BR療法（1サイクル目）	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ ボライビー トレアキシチン	375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ²	1 30分 10分	1 2 2、3	21日毎	M2	
P-BR療法（2~6サイクル目）	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ ボライビー トレアキシチン	375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ²	90分 30分 10分	1 1 1、2	21日毎	M2	
Pola-R-CHP療法 1サイクル目	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ ボライビー ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾロン	375mg/m ² 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	50~400mg/時 90分 15分 30分 注射・経口	1 2 2 2 2-6	21日毎	H4	
Pola-R-CHP療法 2~6サイクル目	悪性リンパ腫	腫瘍内科	リツキシマブ ボライビー ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾロン	375mg/m ² 1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	90分 30分 15分 30分 注射・経口	1 1 1 1 1-5	21日毎	H4	
R-CHOP療法 （CHOP療法）	悪性リンパ腫	腫瘍内科	オンコピン ドキシソルピシン エンドキサン プレドニゾロン リツキシマブ	1.4mg/m ² 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg 375mg/m ²	15分 15分 30分 経口 50~400mg/時→以降90分	1 1 1 1 1	21日毎	H4	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
R-THP-COP療法 (THP-COP療法)	悪性リンパ腫	腫瘍内科	オンコピン テラルピシン エンドキサン ブレドニゾロン リツキシマブ	1.4mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg 375mg/㎡	15分 15分 30分 経口 50~400mg/時	1 1 1 1~5 15	21日毎	M3	
V-CAP療法	悪性リンパ腫	腫瘍内科	ベルケイド ドキシソピシン エンドキサン ブレドニゾロン	1.3mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg	皮下注 15分 30分 経口	1, 4, 8, 11 1 1 1~5	21日毎	M3	
VR-CAP療法	悪性リンパ腫	腫瘍内科	ベルケイド ドキシソピシン エンドキサン ブレドニゾロン リツキシマブ	1.3mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg 375mg/㎡	皮下注 15分 30分 経口 50~400mg/時	1, 4, 8, 11 1 1 1~5 1	21日毎	M3	
【2日間】BR療法（FL）	悪性リンパ腫 (濾胞性リンパ腫)	腫瘍内科	リツキシマブ トレアキシン	375mg/㎡ 90mg/㎡	初回50~400mg/時→以降90分 10分	1 1, 2	28日毎	M1	
【3日間】BR療法（FL）	悪性リンパ腫 (濾胞性リンパ腫)	腫瘍内科	リツキシマブ トレアキシン	375mg/㎡ 90mg/㎡	初回50~400mg/時→以降90分 10分	1 2, 3	28日毎	M1	
トレアキシン療法100mg/㎡（CLL）	慢性リンパ性白血病	腫瘍内科	トレアキシン	100mg/㎡	10分	1, 2	21日毎	M2	
[皮下]DBd療法 1-3サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ベルケイド レナデックス	1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/日	皮下注 皮下注 経口	1, 8, 15 1, 4, 8, 11 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DBd療法 4-8サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ベルケイド レナデックス	1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/日	皮下注 皮下注 経口	1 1, 4, 8, 11 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DBd療法 9サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ レナデックス	1800mg/body 20mg/日	皮下注 経口	1 1	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DCd療法 1サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ カイプロリス カイプロリス レナデックス レナデックス	1800mg/body 56mg/㎡ 20mg/㎡ 40mg/日 20mg/日	皮下注 60分 60分 経口 経口	1, 8, 15, 22 8, 9, 15, 16 1, 2 22 8, 9, 15, 16	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DCd療法 2サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ カイプロリス レナデックス レナデックス	1800mg/body 56mg/㎡ 40mg 20mg	皮下注 60分 経口 経口	1, 8, 15, 22 1, 2, 8, 9, 15, 16 22 1, 2, 8, 9, 15, 16	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DCd療法 3-6サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ カイプロリス レナデックス レナデックス	1800mg/body 56mg/㎡ 40mg 20mg	皮下注 60分 経口 経口	1, 15 1, 2, 8, 9, 15, 16 22 1, 2, 8, 9, 15, 16	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DCd療法 7サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ カルフィゾミブ レナデックス レナデックス	1800mg/body 56mg/㎡ 40mg/日 20mg/日	皮下注 60分 経口 経口	1 1, 2, 8, 9, 15, 16 22 1, 2, 8, 9, 15, 16	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DLd療法 1-2サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ レブラミド レナデックス	1800mg/body 25mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1~21 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
[皮下]DLd療法 3-6サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ レブラミド レナデックス レナデックス	1800mg/body 25mg 40mg 20mg	皮下注 経口 経口 経口	1, 15 1~21 8, 22 1, 2, 15, 16	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
[皮下]DLd療法 7サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ レブラミド レナデックス レナデックス	1800mg/body 25mg/日 40mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口 経口	1 1~21 8, 15, 22 1, 2	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
[皮下]DPd療法 1-2サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ボマリスト レナデックス	1800mg/body 4mg/日 40mg/日	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1~21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
[皮下]DPd療法 3-6サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ボマリスト レナデックス	1800mg/body 4mg/日 40mg/日	皮下注 経口 経口	1, 15 1~21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]DPd療法 7サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ボマリスト レナデックス	1800mg/body 4mg/日 40mg/日	皮下注 経口 経口	1 1~21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
BD療法	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド レナデックス	1.3mg/m ² 20mg/日	皮下注 経口	1, 4, 8, 11 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	3コース目以降はレナデックスはDAY1, 2, 4, 5のみ
BPd療法（75歳以下）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド ボマリスト レナデックス	1.3mg/m ² 4mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 4, 8, 11 1~14 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	9コース目以降はベルケイドはDAY1, 8のみ、レナデックスはDAY1, 2, 8, 9のみ
BPd療法（76歳以上）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド ボマリスト レナデックス	1.3mg/m ² 4mg/日 10mg/日	皮下注 経口 経口	1, 4, 8, 11 1~14 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	9コース目以降はベルケイドはDAY1, 8のみ、レナデックスはDAY1, 2, 8, 9のみ
DBd療法 1-3サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg	50~200mL/時 皮下注 経口	1, 8, 15 1, 4, 8, 11 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
DBd療法 4-8サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス ベルケイド レナデックス	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg/日	50~200mL/時 皮下注 経口	1 1, 4, 8, 11 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
DBd療法 9サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス レナデックス	16mg/kg 20mg/日	50~200mL/時 経口	1 1	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
DLd療法（初発、再発） 1~2サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス レブラミド レナデックス	16mg/kg 25mg/日 20mg/日	50~200mL/時 経口 経口	1, 8, 15, 22 1~21 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
DLd療法（初発、再発） 3-6サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス レブラミド レナデックス レナデックス	16mg/kg 25mg/日 40mg/日 20mg/日	50~200mL/時 経口 経口 経口	1, 15 1~21 8, 22 1, 2, 15, 16	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
DLd療法（初発、再発） 7サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス レブラミド レナデックス レナデックス	16mg/kg 25mg/日 40mg/日 20mg/日	50~200mL/時 経口 経口 経口	1 1~21 8, 15, 22 1, 2	28日毎	L4	経口薬投与量については適正使用ガイドを遵守すること
D-MPB療法 10サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス	16mg/kg	50~200mL/時	1	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
D-MPB療法 2-9サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス ベルケイド レナデックス（デキサメタゾン） プレドニゾン アルケラン	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg/body 60mg/m ² 9mg/m ²	50~200mL/時 皮下注 注射・経口 経口 経口	1, 22 1, 8, 22, 29 1, 22 2~4 1~4	42日毎	L4	
D-MPB療法 1サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラザレックス ベルケイド レナデックス（デキサメタゾン） プレドニゾン アルケラン	16mg/kg 1.3mg/m ² 20mg/body 60mg/m ² 9mg/m ²	50~200mL/時 皮下注 注射・経口 経口 経口	1, 8, 15, 22, 29, 36 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 1, 8, 15, 22, 29, 36 1~4 1~4	42日毎	L4	
E-Ld療法（1~2コース目） （エムプリシティ）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	エムプリシティ レブラミド レナデックス デキサート	10mg/kg 25mg/日 28mg/日 6.6mg	0.5~5mL/分 経口 経口 15分	1, 8, 15, 22 1~21 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	エムプリシティ投与3~24時間前にレナデックスを服用
E-Ld療法（3コース目以降） （エムプリシティ）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	エムプリシティ レブラミド レナデックス	10mg/kg 25mg/日 40mg/日	5mL/分 経口 経口	1, 15 1~21 8, 22	28日毎	L4	エムプリシティ投与3~24時間前にレナデックスを服用
EPd療法 1~2サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	エムプリシティ ボマリスト デキサート	10mg/kg 4mg/日 6.6mg	4~7時間 経口 15分	1, 8, 15, 22 1~21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	76歳以上の場合はレナデックスを8mgへ減量

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
EPd療法 3サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	エムアリンゾイ ボマリスト	20mg/kg 4mg/日	4～7時間 経口	1 1～21	28日毎	L4	76歳以上の場合はレナデックスを20mgへ減量
Kd療法（1コース目）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	カイプロリス カイプロリス レナデックス	20mg/㎡ 56mg/㎡ 20mg/日	30分 30分 経口	1, 2 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日毎	L4	
Kd療法（2コース目以降）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	カイプロリス レナデックス	56mg/㎡ 20mg/日	30分 経口	1, 2, 8, 9, 15, 16 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日毎	L4	
KRd療法（13コース目以降）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	カイプロリス レブラミド レナデックス	20mg/㎡ 25mg/日 40mg/日	10分 経口 経口	1, 2, 15, 16 1～21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	
KRd療法（1コース目）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	カイプロリス カイプロリス レブラミド レナデックス	20mg/㎡ 27mg/㎡ 25mg/日 40mg/日	10分 10分 経口 経口	1, 2 8, 9, 15, 16 1～21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	
KRd療法（2～12コース目）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	カイプロリス レブラミド レナデックス	27mg/㎡ 25mg/日 40mg/日	10分 経口 経口	1, 2, 8, 9, 15, 16 1～21 1, 8, 15, 22	28日毎	L4	
PAD療法	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド ドキソルピシン レナデックス	1mg/㎡ 9mg/㎡ 20mg/日	皮下注 30分 経口	1, 4, 8, 11 1～4 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	M3	
VCD療法	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド エンドキサン レナデックス	1.3mg/㎡ 300mg/㎡ 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	28日毎	M5	
VMP療法	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド ブレドニゾロン アルケラン	1.3mg/㎡ 60mg/㎡ 9mg/㎡	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1～4 1～4	28日毎	L4	
VRD lite療法（75歳以下）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド レブラミド レナデックス	1.3mg/㎡ 15mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1～21 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	35日毎	L4	
VRD lite療法（76歳以上）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド レブラミド レナデックス	1.3mg/㎡ 15mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 8, 15, 22 1～21 1, 8, 15, 22	35日毎	L4	
VRD療法（1～4コース目）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド レブラミド レナデックス	1.3mg/㎡ 25mg/日 20mg/日	皮下注 経口 経口	1, 4, 8, 11 1～14 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	
VRD療法（5コース目以降）	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ベルケイド レブラミド レナデックス	1.3mg//日㎡ 25mg/日 10mg/日	皮下注 経口 経口	1, 4, 8, 11 1～14 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日毎	L4	
[皮下]D-MPB療法 10サイクル目以降	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ	1800mg/body	皮下注	1	28日毎	L4	75歳を超える場合は、適正使用ガイドに準じ、レナデックスを減量する。
[皮下]D-MPB療法 1サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ベルケイド レナデックス ブレドニゾロン アルケラン	1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/body 60mg/㎡ 9mg/㎡	皮下注 皮下注 経口 経口 経口	1, 8, 15, 22, 29, 36 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32 1, 8, 15, 22, 29, 36 2～4 1～4	42日毎	L4	
[皮下]D-MPB療法 2-9サイクル目	多発性骨髄腫	腫瘍内科	ダラキューロ ベルケイド レナデックス ブレドニゾロン アルケラン	1800mg/body 1.3mg/㎡ 20mg/body 60mg/㎡ 9mg/㎡	皮下注 皮下注 経口 経口 経口	1, 22 1, 8, 22, 29 1, 22 2～4 1～4	42日毎	L4	
ALL202-U 維持療法①	急性リンパ性白血病	血液内科	メントレキセート ロイケリン散 メントレキセート キロサイド デキサート	150mg/㎡ 50mg/㎡ 12mg 30mg 3.3mg	30分 経口 髄注 髄注 髄注	1, 15, 29 1～28 29 29 29	42日	L2	8回実施する 1回目のメントレキセートはDay29のみ 髄注は5回目まで実施
AC療法	乳がん	乳腺外科	ドキソルピシン エンドキサン	60mg/㎡ 600mg/㎡	10分 20分	1 1	21日毎	H1	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
Atezo+nab-PTX	乳がん	乳腺外科	テセントリク アブラキサン	840mg/body 100mg/m ²	60分→以降30分 30分	1、15 1、8、15	28日毎	L2	
Bev+PTX	乳がん	乳腺外科	アバステン パクリタキセル	10mg/kg 90mg/m ²	30分 1時間	1、15 1、8、15	28日毎	L3	
CAF (FAC)	乳がん	乳腺外科	ドキシゾピシン エンドキサン フルオロウラシル	50mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	10分 10分 10分	1	21日毎	M1	
CMF (変法)	乳がん	乳腺外科	メソトレキセート エンドキサン	40mg/m ² 500mg/m ²	10分 10分	1、8 1、8	28日毎	M2	
CMFclassic	乳がん	乳腺外科	メソトレキセート エンドキサン フルオロウラシル	40mg/m ² 100-150mg 600mg/m ²	10分 経口 10分	1、8 1-14 1、8	28日毎	M4	
CPT-11(4投2休)	乳がん	乳腺外科	イリノテカン	100mg/m ²	90分	1、8、15、22	42日毎	M2	
CPT-11 (4投2休) + HER	乳がん	乳腺外科	イリノテカン トラスツマブ	100mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	90分 90分→以降30分	1、8、15、22 1、22	42日毎	M2	
dose dense AC療法	乳がん	乳腺外科	ドキシゾピシン エンドキサン	60mg/m ² 600mg/m ²	10分 20分	1 1	14日毎	H1	4コース peg G-CSF使用必須
dose dense PTX療法	乳がん	乳腺外科	パクリタキセル	175mg/m ²	180分	1	14日毎	L3	4コース peg G-CSF使用必須
DTX + HER	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル トラスツマブ	75mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	60分 90分→以降30分	1 1	21日毎	L3	
DTX + HP療法	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル トラスツマブ ベルツマブ	75mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	60分 90分→以降30分 60分→以降30分	1 1 1	21日毎	L3	
DTX療法	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル	75mg/m ²	60分	1	21日毎	L3	
EC療法	乳がん	乳腺外科	エビルピシン エンドキサン	90mg/m ² 600mg/m ²	10分 20分	1 1	21日毎	H2	
Eribulin	乳がん	乳腺外科	ハラヴェン	1.4mg/m ²	5分	1、8	21日毎	L3	
Eribulin+HER	乳がん	乳腺外科	ハラヴェン トラスツマブ	1.4mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	5分 90分→以降30分	1、8 1	21日毎	L3	
Eribulin+HP	乳がん	乳腺外科	ハラヴェン トラスツマブ ベルツマブ	1.4mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	5分 90分→以降30分 60分→以降30分	1、8 1 1	21日毎	L3	
FEC100療法	乳がん	乳腺外科	エビルピシン エンドキサン フルオロウラシル	100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	10分 10分 10分	1 1 1	21日毎	H2	
GEM+PTX	乳がん	乳腺外科	ジェムザール パクリタキセル	1250mg/m ² 175mg/m ²	30分 3時間	1、8 1	21日毎	L1	
GEM乳腺 (院内統一)	乳がん	乳腺外科	ジェムザール	1250mg/m ²	30分	1、8	21日毎	L3	
GEM乳腺+HER	乳がん	乳腺外科	ジェムザール トラスツマブ	1250mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	30分 90分→以降30分	1、8 1	21日毎	L3	
HER-TC	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル エンドキサン トラスツマブ	75mg/m ² 600mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	60分 20分 90分→以降30分	1 1 1	21日毎	M2	
HER-TC療法	乳がん	乳腺外科	トラスツマブ ドセタキセル エンドキサン	初回8mg/kg→以降6mg/kg 75mg/m ² 600mg/m ²	90分→以降30分 60分 20分	1 1 1	21日毎	M2	
HP	乳がん	乳腺外科	トラスツマブ ベルツマブ	初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	90分→以降30分 60分→以降30分	1 1	21日毎	-	
nab-PTX	乳がん	乳腺外科	アブラキサン	260mg/m ²	30分	1	21日毎	L1	
nab-PTX+HER	乳がん	乳腺外科	アブラキサン トラスツマブ	260mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	30分 90分→以降30分	1 1	21日毎	L1	
Pembro+Gem+Car	乳がん	乳腺外科	キイトルーダ ジェムザール カルボプラチン	200mg/body 1000mg/m ² AUC=2	30分 30分 1時間	1 1、8 1、8	21日毎	M2	
TCbH	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル カルボプラチン トラスツマブ	75mg/m ² AUC=6 初回8mg/kg→以降6mg/kg	60分 60分 90分→以降30分	1 1 1	21日毎	M2	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日（Day）	投与間隔	制吐療法	備考
TCbHP療法	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル カルボプラチン トラスツズマブ ベルツズマブ	75mg/m ² AUC 6 初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	60分 60分 90分→以降30分 60分→以降30分	1 1 1 1	21日毎	M1	
TC療法	乳がん	乳腺外科	ドセタキセル エンドキサン	75mg/m ² 600mg/m ²	60分 20分	1 1	21日毎	M2	
T-DM1療法	乳がん	乳腺外科	トラスツズマブエムタンシン	3.6mg/m ²	90分→以降30分	1	21日毎	L4	
T-DXd. (HER2低・高発現)	乳がん	乳腺外科	エンハーツ	5.4mg/kg	90分→以降30分	1	21日毎	M1	
VNR	乳がん	乳腺外科	ビノレルビン	25mg/m ²	5分	1、8	21日毎	—	血管炎予防でDEX注使用
VNR+HER	乳がん	乳腺外科	ビノレルビン トラスツズマブ	25mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	5分 90分→以降30分	1、8 1	21日毎	—	血管炎予防でDEX注使用
VNR+HP	乳がん	乳腺外科	ビノレルビン トラスツズマブ ベルツズマブ	25mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	5分 90分→以降30分 60分→以降30分	1、8 1 1	21日毎	—	血管炎予防でDEX注使用
wPTX（3投1休）	乳がん	乳腺外科	バクリタキセル	80mg/m ²	60分	1、8、15	28日毎	L3	
wPTX(3投0休)+wHER療法	乳がん	乳腺外科	バクリタキセル トラスツズマブ	80mg/m ² 初回4mg/kg→以降2mg/kg	60分 90分→以降30分	1、8、15 1、8、15	21日毎	L3	術前・術後補助化学療法ではPTX12回投与
wPTX(3投0休)療法	乳がん	乳腺外科	バクリタキセル	80mg/m ²	60分	1、8、15	21日毎	L3	術前・術後補助化学療法ではPTX12回投与
wPTX+HER(q3w)療法	乳がん	乳腺外科	バクリタキセル トラスツズマブ	80mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg	60分 90分→以降30分	1、8、15 1	21日毎	L3	術前・術後補助化学療法ではPTX12回投与
wPTX+HP療法	乳がん	乳腺外科	バクリタキセル トラスツズマブ ベルツズマブ	80mg/m ² 初回8mg/kg→以降6mg/kg 初回840mg→以降420mg	60分 90分→以降30分 60分→以降30分	1、8、15 1 1	21日毎	L3	術前・術後補助化学療法ではPTX12回投与
術後Pembro（200mg）	乳がん	乳腺外科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
術前Pembro+AC	乳がん	乳腺外科	キイトルーダ ドキシソピシン エンドキサン	200mg/body 60mg/m ² 600mg/m ²	30分 10分 20分	1 1 1	21日毎	H1	4コース
術前Pembro+wPTX+wCar	乳がん	乳腺外科	キイトルーダ バクリタキセル カルボプラチン	200mg/body 80mg/m ² AUC = 1.5	30分 1時間 30分	1 1、8、15 1、8、15	21日毎	M2	4コース
A単剤	婦人科がん	婦人科	ドキシソピシン	60mg/m ²	全開	1	21日毎	H3	
CDDP+CPT-11	婦人科がん	婦人科	シスプラチン イリノテカン	60mg/m ² 60mg/m ²	180分 day1 180分, day8・15 90分	1 1、8、15	28日毎	H2	
Dose-dence TC	婦人科がん	婦人科	バクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC = 6	60分 60分	1、8、15 1	21日毎	M2	
DTX/GEM	婦人科がん	婦人科	ジェムザール ドセタキセル	800mg/m ² 70mg/m ²	30分 60分	1、8 8	21日毎	L1	
Gem+C	婦人科がん	婦人科	ジェムザール カルボプラチン	1000mg/m ² AUC = 4	30分 60分	1、8 1	21日毎	M2	
Gem+C+Bev	婦人科がん	婦人科	ジェムザール カルボプラチン アバステン	1000mg/m ² AUC = 4 15mg/kg	30分 60分 30分	1、8 1 1	21日毎	M2	
IN	婦人科がん	婦人科	アクブラ イホマイド	70mg/m ² 1g/body	180分 120分	1 1、2、3、4、5	21日毎	M2	
Pembro+Bev（3週間）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ アバステン	200mg/body 15mg/kg	30分 30分	1 1	21日毎	—	
Pembro+Bev（6週間）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ アバステン	400mg/body 15mg/kg	30分 30分	1 1、22	42日毎	—	
Pembro200mg（レンパチニブ併用）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ レンピマ	200mg/body 20mg/日	30分 経口	1 連日	21日毎	—	
Pembro400mg（レンパチニブ併用）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ レンピマ	400mg/body 20mg/日	30分 経口	1 連日	42日毎	—	
Pembro単剤維持（3週間）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
Pembro単剤維持（6週間）	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
PLD+Bev	婦人科がん	婦人科	ドキシル アバステン	40mg/m ² 10mg/kg	1mg/分 30分	1 1、15	28日毎	L2	

がん化学療法レジメン集（2023年5月版）

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
TC+Pembro療法	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	M2	
			バクリタキセル	175mg/m ²	3時間	1			
			カルボプラチン	AUC=5	1時間	1			
TCB	婦人科がん	婦人科	バクリタキセル	175mg/m ²	180分	1	21日毎	M2	
			カルボプラチン	AUC=5	60分	1			
			アバスチン	15mg/kg	30分	1			
TCB+Pembro療法	婦人科がん	婦人科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	M2	
			バクリタキセル	175mg/m ²	3時間	1			
			カルボプラチン	AUC=5	1時間	1			
			アバスチン	15mg/kg	30分	1			
TP	婦人科がん	婦人科	バクリタキセル	175mg/m ²	180分	1	21日毎	H2	
			シスプラチン	60mg/m ²	120分	1			
TPB	婦人科がん	婦人科	バクリタキセル	175mg/m ²	180分	1	21日毎	H2	
			シスプラチン	50mg/m ²	120分	1			
			アバスチン	15mg/kg	30分	1			

がん化学療法レジメン集 (2023年5月版)

レジメン名	がん種	使用診療科	薬品名	1日投与量	投与時間	投与日 (Day)	投与間隔	制吐療法	備考
TPT+Bev	婦人科がん	婦人科	ハイカムチン アバスタチン	1.25mg/m ² 15mg/kg	30分 30分	1、2、3、4、5 1	21日毎	L2	
T単剤weekly (パクリタキセル)	婦人科がん	婦人科	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	1	7日毎	L3	
weeklyTC	婦人科がん	婦人科	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m ² AUC=2	90分 30分	1 1	7日毎	M2	
外来DC	婦人科がん	婦人科	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/m ² AUC=5	90分 60分	1 1	21日毎	M2	
外来TC	婦人科がん	婦人科	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m ² AUC=5	180分 60分	1 1	21日毎	M2	
セミブリマブ療法	婦人科がん	婦人科	リブタヨ	350mg/body	30分	1	21日毎	—	
統一GEM (3投1休)	婦人科がん	婦人科	ジェムザール	1000mg/m ²	30分	1、8、15	28日毎	L3	
ドキシル	婦人科がん	婦人科	ドキシル	50mg/m ²	1mg/分	1	28日毎	L2	
ペバシズマブ単剤	婦人科がん	婦人科	アバスタチン	15mg/kg	30分	1	21日毎	—	
放射線併用CCDDP療法 (CCRT)	婦人科がん	婦人科	シスプラチン	40mg/m ²	120分	1	7日毎	H2	
NIVO (240mg) +IPI (1-4コース)	腎細胞がん	泌尿器科	オプジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	30分 30分	1 1	21日毎	—	
キイトルーダ+インライタ	腎細胞がん	泌尿器科	キイトルーダ インライタ	200mg/body 初回10mg/日	30分 経口	1 連日	21日毎	—	最大1回10mg1日2回まで増量可能
ニボルマブ (2週間) -カボザンチニブ	腎細胞がん	泌尿器科	オプジーボ カボメティクス	240mg/body 40mg/日	30分 経口	1 連日	14日毎	—	
ニボルマブ (4週間)	腎細胞がん	泌尿器科	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
ニボルマブ (4週間) -カボザンチニブ	腎細胞がん	泌尿器科	オプジーボ カボメティクス	480mg/body 40mg/日	30分 経口	1 連日	28日毎	—	
ニボルマブ240mg (泌尿器)	腎細胞がん	泌尿器科	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
パベンチオ+インライタ併用療法	腎細胞がん	泌尿器科	パベンチオ インライタ	10mg/kg 初回10mg/日	60分 経口	1 連日	14日毎	—	最大1回10mg1日2回まで増量可能
ペムプロリズマブ (adj) 3週間	腎細胞がん	泌尿器科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
ペムプロリズマブ (adj) 6週間	腎細胞がん	泌尿器科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
レンパチニブ-ペムプロリズマブ200mg	腎細胞がん	泌尿器科	キイトルーダ レンピマ	200mg/body 20mg/日	30分 経口	1 連日	21日毎	—	
レンパチニブ-ペムプロリズマブ400mg	腎細胞がん	泌尿器科	キイトルーダ レンピマ	400mg/body 20mg/日	30分 経口	1 連日	42日毎	—	
GC療法 (GEM + CDDP) ShortHydration	泌尿器がん	泌尿器科	ジェムザール シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 1時間	1、8、15 (1、8) 2 (2)	28日毎 (21日)	H2	
GEM + CBDCA療法	泌尿器がん	泌尿器科	ジェムザール カルボプラチン	1000mg/m ² AUC=4、5	30分 1時間	1、8 1	21日毎	M2	
weeklyドセタキセル療法	泌尿器がん	泌尿器科	ドセタキセル	30mg/m ²	60分	1	7日毎	L1	
エンホルツマブパドチン	泌尿器がん	泌尿器科	パドセブ	1.25mg/kg	30分	1	28日毎	—	
キイトルーダ	泌尿器がん	泌尿器科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
キイトルーダ (6週間)	泌尿器がん	泌尿器科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
ジェブタナ療法	泌尿器がん	泌尿器科	ジェブタナ	25mg/m ²	60分	1	21日毎	L3	
ドセタキセル療法	泌尿器がん	泌尿器科	ドセタキセル	75mg/m ²	60分	1	21日毎	L3	
ニボルマブ (adj) 2週間	泌尿器がん	泌尿器科	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
ニボルマブ (adj) 4週間	泌尿器がん	泌尿器科	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
パベンチオ	泌尿器がん	泌尿器科	パベンチオ	10mg/kg	1時間	1	14日毎	—	
アドリアシン単剤60mg/m ²	肉腫	全科	ドキシルピシン	60mg/m ²	15分	1	21日毎	H3	
NIVO (240mg) +IPI (5コース以降)	悪性黒色腫	全科	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
NIVO (80mg) +IPI (1-4コース)	悪性黒色腫	全科	オプジーボ ヤーボイ	80mg/body 3mg/kg	30分 30分	1 1	21日毎	—	
Pembro200mg q3w	悪性黒色腫	全科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
Pembro400mg q6w	悪性黒色腫	全科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
イピリムマブ (ヤーボイ)	悪性黒色腫	全科	ヤーボイ	3mg/kg	30分	1	21日毎	—	
ニボルマブ (240mg)	悪性黒色腫	全科	オプジーボ	240mg/body	30分	1	14日毎	—	
ニボルマブ (480mg)	悪性黒色腫	全科	オプジーボ	480mg/body	30分	1	28日毎	—	
Pembro200mg q3w(TMB-High)	TMB-High	全科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
Pembro400mg q6w(TMB-High)	TMB-High	全科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	
Pembro200mg q3w(MSI-High)	MSI-High	全科	キイトルーダ	200mg/body	30分	1	21日毎	—	
Pembro400mg q6w(MSI-High)	MSI-High	全科	キイトルーダ	400mg/body	30分	1	42日毎	—	